

# Kraujalakinis melsvys (*Maculinea teleius*)

Ekologinės sistemos „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ remiama veikla „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“



Rūšis turi išskirtinius santykius su skruzdėlėmis ir yra genialūs plėšrūnai! Patelės deda kiaušinius ant vaistinės kraujalakės (*Sanguisorba officinalis*), kur išsiritę vikšrai 2 - 3 savaites liepos mėnesį maitinasi jų žiedynais. Ūgtelėję vikšrai leidžiasi ant žemės ir pradeda skleisti garsus imituojančius *Myrmica* genties skruzdėlių motinėle. Vikšrą suradusi patruliuojanti darbininkė skubiai gabena jį į skruzdėlyną, manydama, kad tai „motinėle“. Tačiau realybėje, ką tik žolėdžiu buvęs vikšras, patekęs į skruzdėlyną pradeda maitintis skruzdžių lervomis. Maskuotė tokia geniali, kad darbininkės ne tik nieko nepastebi, bet dar ir prižiūri, valo ir saugo melsvio vikšrą. Skruzdėlyne jis gyvena apie 11 mėnesių iki kol išsiritą į suaugusį drugį.

## Specifiniai reikalavimai pagal ekologinės sistemos taisykles

**Pasitikrink kokios dar vertybės gyvena tavo lauke**

1. Neįrengti naujų sausavimo, drėkinimo sistemų;
2. Nearti, įskaitant ir bearimes technologijas, ir nepersėti kultūrinėmis žolėmis;
3. Nenaudoti augalų apsaugos produktų, neturėti mineralinėmis ir organinėmis trąšomis, neskleisti nuotekų dumblo, nekalkinti;
4. Šienavimą pradėti ne anksčiau kaip einamųjų metų birželio 20 d.
5. Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) baigti iki einamųjų metų spalio 1 d.
6. Šienaujant kasmet palikti 20–30 proc. nešienauto ploto, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet;
7. Pievose žolę išvežti iki einamųjų metų spalio 1 d., šlapynėse-iki kitų metų kovo 1 d.;
8. Nesmulkinti ir nepaskleisti nušienautos žolės;
9. Nušienautą žolę išdžiovinti prieš surenkant ir likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki išdžiovintos žolės išvežimo, tačiau ne vėliau nei iki einamųjų metų spalio 1 d. mobiliąja programėle „NMA agro“ pateikti deklaruojamame lauke nušienautos žolės nuotraukas iš skirtingų lauko vietų;
9. Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha intensyvumu, žolės likučius nušienauti ir išvežti vadovaujantis 4-5 ir 7-8 punktais;
10. Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami;
11. Papildomai nešerti (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą;
12. Ganiavos laikotarpis neribojamas.